

FJERNELSE AF POLYPPER I FULD BEDØVELSE (ADENOTOMI)


v. 2.0

(sidst opdateret: januar 2019)

Dit barn har fået tid til fjernelse af børnepolypper i fuld bedøvelse.

Børnepolypper (adenoide vegetationer):

Børnepolypper er lymfevæv i toppen af næse-svælg-rummet som minder om mandlernes væv. Børnepolypper har ingen sammenhæng med næsepolypper som man ser hos voksne med allergi.



Børnepolypper vokser typisk frem i forbindelse med almindelige virus- og bakterieinfektioner, som børnene pådrager sig. Polypper forekommer ofte hos børn i 3-8 års alderen og hos nogle børn vokser polypperne så meget, at de bliver generende og barnet skal have dem fjernet. På grund af polyppers lokalisation i toppen af næsesvælggrummet, kan de medføre forskellige gener og problemer for barnet.

Hvad er symptomerne på polypper?

Typisk vil barnet blive tæt i næsen og forældrene vil bemærke at barnet ofte ånder gennem munden og går rundt med "åben mund og polypper". Når barnet taler, lyder stemmen nasal, barnet snøvler og der sidder næsten altid 11-taller af snot. Tæthed i næsen kan føre til, at søvnen bliver urolig, og at barnet snorker fordi det ikke kan trække

vejret gennem næsen. Børn med polypper har ligeledes større tendens til at danne væske i mellemøret ligesom børnene hyppigere får mellemørebetændelse.

Hvornår skal der fjernes polypper:

Dit barn vil blive tilbudt at få fjernet polypper såfremt disse konstateres OG:

- Såfremt barnet er generet af kun at kunne trække vejret gennem munden når barnet spiser eller bruger sut.
- Såfremt barnet har urolig søvn og snorker pga. polypperne
- Såfremt barnet har væske i mellemøret OG polypper – OG drænanlæggelse er / har været nødvendig.

Før operationen - fasteregler og smertestillende:

Barnet skal faste (må ikke spise) i seks timer op til det aftalte operations-tidspunkt. Det er tilladt at drikke klare væsker (sød saft, vand, og klar juice indtil to timer før operationen. Barnet må **ikke** drikke mælk eller juice som indeholder frugtkød. De sidste to timer inden operationen skal barnet være fastende og tørstende.

Det er livsvigtigt at barnet er fastende.

Af hensyn til hygiejne og infektionsrisiko skal barnet møde nyvasket og med rent hår. Barnets udendørssko og overtøj (flyverdragter og lign.) må ikke medtages på operationsstuen.

To timer før operationen gives smertestillende efter skriftlig instruks med dosis og præparat.

Barnet skal ledsages af to voksne personer, således at den ene kan tage sig af barnet under hjemtransporten. Andre børn må ikke medtages på operationsdagen.

Om bedøvelsen:

I klinikken møder I på operationsdagen klinikens faste speciallæge i anæstesiologi som forestår selve bedøvelsen. Under operationen sikrer narkoselægen sig at barnet sover trygt og godt og er smertedækket under hele indgrebet.

På operationsdagen skal I altid medbringe eventuel asthmamedicin (den orange/brune og blå inhalator) såfremt barnet er i behandling med dette.

Det er vigtigt at I har udfyldt anæstesiskemaet inden I møder til operationen og afleverer dette i udfyldt stand til anæstesilægen.

Om operationen:

Polypperne fjernes gennem munden mens barnet sover. Efter polypperne er fjernet, hvilket tager ca. 15 minutter, vækkes barnet igen og flyttes til et opvågningsleje, hvor sygeplejersken observerer barnet til det er helt vågent igen, hvorefter I kan tage hjem.

Da polypperne har en stor blodforsyning, vil det efter operationen bløde fra næsen, hvilket er normalt. Dette er som regel kun ganske små mængder og stopper af sig selv igen og I bliver ikke sendt hjem, før alt er under kontrol.

Efter operationen:

I bør ikke tage offentlig transport hjem, men enten køre i bil, eller tage en taxa hjem sammen. I de første to døgn efter operationen skal der være en voksen sammen med barnet konstant.

Blødninger efter fjernelse af polypper er sjældent kraftige, men skulle en kraftig blødning opstå, skal dette tages alvorligt. Det er derfor vigtigt at barnet i de første to døgn observeres af forældrene, som kan reagere hvis det, mod forventning, skulle blive nødvendigt.

I tilfælde af kraftig frisk blødning fra næse eller mund, skal du med det samme ringe 112 og blive kørt med ambulance til nærmeste hospital.

Forholdsregler efter operationen:

Barnet skal passes hjemme af en voksen resten af ugen, dvs. både på operationsdagen (onsdag) samt torsdag og fredag, men kan komme i institution igen allerede om mandagen. Såfremt der også er foretaget reduktion af mandlerne, skal der i nogle tilfælde beregnes flere sygedage - sørg derfor for at have børnepasning i baghånden til ekstra dage!

Kontrol efter operationen:

Den fulde effekt af operationen kan ikke forventes før der er gået 4-8 uger. I de første uger efter operationen vil der være hævelse omkring sårhelingen, hvorfor den fulde effekt først indtræder når barnet er helet færdig efter indgrebet.

Der er ikke planlagt nogen kontrol efter operationen, men såfremt indgrebet ikke har det forventede resultat, kan tid til vurdering bestilles (tidligst) efter ca. tre måneder.

Såfremt der samtidig er lagt dræn gives en kontroltid af drænene efter 14 dage.

Med venlig hilsen
Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd